

貯法：室温保存  
有効期間：3 年

|      |                  |
|------|------------------|
| 承認番号 | 21600AMZ00110000 |
| 販売開始 | 2004 年 4 月       |

## 外用殺菌消毒剤

# 消毒用エタライト®液

## Ethalight Solution for Disinfection

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）  
損傷皮膚及び粘膜には使用しないこと〔刺激作用を有する〕

### 3. 組成・性状

#### 3.1 組成

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 販売名  | 消毒用エタライト液                |
| 有効成分 | 100mL 中<br>エタノール<br>83mL |
| 添加剤  | イソプロパノール                 |

#### 3.2 製剤の性状

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 販売名 | 消毒用エタライト液          |
| 性状  | 無色澄明の液で、特異なにおいがある。 |

### 4. 効能又は効果

手指・皮膚の消毒、手術部位（手術野）の皮膚の消毒、医療機器の消毒

### 6. 用法及び用量

本品をそのまま消毒部位に塗布する。

### 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には使用を中止するなど適切な処置を行うこと。

#### 11.2 その他の副作用

|     |      |
|-----|------|
|     | 頻度不明 |
| 過敏症 | 発疹等  |
| 皮膚  | 刺激症状 |

### 12. 臨床検査結果に及ぼす影響

注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの判断を妨害することがある。

### 14. 適用上の注意

#### 14.1 薬剤使用時の注意

- 14.1.1 外用にのみ使用すること。
- 14.1.2 経皮的エタノール注入療法（PEIT）には使用しないこと。
- 14.1.3 眼に入らないように注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。
- 14.1.4 エタノール又はイソプロパノール蒸気に大量に又は繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがあるので、広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。
- 14.1.5 同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- 14.1.6 本剤は血清、胆汁等のタンパク質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療機器等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。
- 14.1.7 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーター等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。
- 14.1.8 引火性があり、爆発の危険性もあるため、火気（電気メス使用等も含む）には十分注意すること。
- 14.1.9 電気メス等を使用する場合には本剤を乾燥させ、アルコール蒸気の拡散を確認してから使用すること。電気メスによる発火事故が報告されている。

### 18. 薬効薬理

#### 18.1 作用機序

アルコールは細胞への浸透性がよいので菌体膜を透過しやすく、菌体蛋白の変性凝固、代謝機能障害、溶菌作用を持つと考えられている<sup>1)</sup>。

#### 18.2 抗菌作用

本剤は、使用濃度において栄養型細菌（グラム陽性菌、グラム陰性菌）、酵母菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞（炭疽菌、破傷風菌等）及び一部のウイルスに対する効果は期待できない。

### 19. 有効成分に関する理化学的知見

一般的名称：エタノール（Ethanol）

化学名：Ethanol

分子式：C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O


分子量：46.07

性 状：無色澄明の液である。

水と混和する。

燃えやすく、点火するとき、淡青色の炎をあげて燃える。揮発性である。

化学構造式：



比重  $d_{4}^{15}$ ：0.79425（100%）

### 20. 取扱い上の注意

火気を避けて保存すること。

### 22. 包装

500mL [ポリ容器]

5L [ポリ容器；コック付]

### 23. 主要文献

- 1) 太田伸 他：月刊薬事. 2000；42（5）：1533-1541

### 24. 文献請求先及び問い合わせ先

ニプロ株式会社 医薬品情報室  
〒566-8510 大阪府摂津市千里丘新町 3 番 26 号  
TEL 0120-226-898  
FAX 050-3535-8939

### 26. 製造販売業者等

#### 26.1 製造販売元

 ヤクハン製薬株式会社  
北海道北広島市北の里27番地

#### 26.2 販売

 NIPRO  
ニプロ株式会社  
大阪府摂津市千里丘新町3番26号