

メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「ニプロ」 メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「ニプロ」

適正使用のお願い

—飲酒について—

製造販売 ニプロ株式会社

メトホルミン塩酸塩を服用中に、飲酒により重篤な乳酸アシドーシスが発現した事例が報告されています。

過度の飲酒により、肝臓における乳酸の代謝が低下し、乳酸が蓄積しやすくなります。また、脱水状態となり、乳酸アシドーシス発現のリスクが高くなります。

乳酸アシドーシスの発現、重症化を予防するために、患者及びその家族の方へ下記の点についてご説明ください。

- お酒を飲みすぎないでください。
- 肝臓が悪い方は禁酒してください。
- 大量にお酒を飲んだときには、メトホルミン塩酸塩の服用を一時的にやめてください。

なお、「過度のアルコール摂取者」への、メトホルミン塩酸塩の投与は禁忌です。

アルコールの適量には個人差があり、「過度のアルコール」の基準はありませんので、あらかじめ患者の飲酒量をご確認ください。

飲酒の機会が増える時期には特に、過度の飲酒を避けるよう患者にご説明ください。

乳酸アシドーシスの発現を避けるための注意点を記載した患者向け指導箋や、投与時チェックシートをご用意しておりますので、ご活用ください。

- 患者向け指導箋
「メトホルミン塩酸塩錠250mgMT・500mgMT「ニプロ」を服用される患者さんへ」
- 医療関係者向け資材
「投与時のチェックシート」

本剤の使用にあたっては、電子添文をよくご確認ください。

専用アプリ「添文ナビ®」でGS1バーコードを読み取ると、最新の電子添文を閲覧可能です。



(01)14987190067309