

—適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。—

「使用上の注意」改訂のお知らせ

アロマターゼ阻害剤/閉経後乳癌治療剤
日本薬局方 アナストロゾール錠
アナストロゾール錠 1mg 「NP」

2026年3月
ニプロ株式会社

このたび、標記製品の「使用上の注意」を自主改訂により下記のとおり改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。

本剤のご使用に際しましては、電子添文の各項を十分ご覧くださいますようお願い申し上げます。

<改訂のポイント>

その他の副作用：「腱炎」を追記

記

改訂後(_____ 下線：追加記載)	改訂前																
11. 副作用 11.1 重大な副作用 11.1.1 現行のとおり 11.1.2 アナフィラキシー(頻度不明)、 <u>血管性浮腫</u> (頻度不明)、 <u>蕁麻疹</u> (1.0%) アナフィラキシー、 <u>血管性浮腫</u> 、 <u>蕁麻疹</u> 等の過敏症状があらわれることがある。 11.1.3～11.1.5 現行のとおり 11.2 その他の副作用	11. 副作用 11.1 重大な副作用 11.1.1 略 11.1.2 アナフィラキシー(頻度不明)、 <u>血管浮腫</u> (頻度不明)、 <u>蕁麻疹</u> (1.0%) アナフィラキシー、 <u>血管浮腫</u> 、 <u>蕁麻疹</u> 等の過敏症状があらわれることがある。 11.1.3～11.1.5 略 11.2 その他の副作用																
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>5%以上</th><th>5%未満</th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td>筋・骨格系</td><td></td><td></td><td>関節痛、硬直、骨折、関節炎、骨粗鬆症、骨痛、<u>弾発指</u>、<u>筋肉痛</u>、<u>腱炎</u></td></tr></tbody></table>		5%以上	5%未満	頻度不明	筋・骨格系			関節痛、硬直、骨折、関節炎、骨粗鬆症、骨痛、 <u>弾発指</u> 、 <u>筋肉痛</u> 、 <u>腱炎</u>	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>5%以上</th><th>5%未満</th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td>筋・骨格系</td><td></td><td></td><td>関節痛、硬直、骨折、関節炎、骨粗鬆症、骨痛、<u>弾発指</u>、<u>筋肉痛</u></td></tr></tbody></table>		5%以上	5%未満	頻度不明	筋・骨格系			関節痛、硬直、骨折、関節炎、骨粗鬆症、骨痛、 <u>弾発指</u> 、 <u>筋肉痛</u>
	5%以上	5%未満	頻度不明														
筋・骨格系			関節痛、硬直、骨折、関節炎、骨粗鬆症、骨痛、 <u>弾発指</u> 、 <u>筋肉痛</u> 、 <u>腱炎</u>														
	5%以上	5%未満	頻度不明														
筋・骨格系			関節痛、硬直、骨折、関節炎、骨粗鬆症、骨痛、 <u>弾発指</u> 、 <u>筋肉痛</u>														

【改訂の理由】

○「その他の副作用」の項

企業報告に基づき、「筋・骨格系」の項に、「腱炎」を追記致しました。

また、「重大な副作用」の項について、「血管浮腫」を「血管性浮腫」に記載整備致しました。

以上

今後とも当社製品のご使用にあたって副作用等の有害事象をご経験の際には、当社MRまで、できるだけ速やかにご連絡くださいますようお願い申し上げます。

◎DSU (医薬品安全対策情報) No.344 掲載予定 (令和8年4月発行予定)

◎最新の電子添文は医薬品医療機器総合機構の「医療用医薬品情報検索ページ」(<https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/>)に掲載しています。また当社医療関係者向けホームページ (<https://med.nipro.co.jp/pharmaceuticals>)にも掲載しています。

また、専用アプリ「添文ナビ」で下記GS1バーコードを読み取ることで、最新の電子添文等をご参照いただけます。

アナストロゾール錠 1mg 「NP」

